

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE EXAMEN GASTROPANEL™

Antes de la toma de muestra de sangre, por favor siga las siguientes instrucciones:

Puede tomar medicación previamente prescrita y habitual, excepto los siguientes medicamentos que interfieren con la secreción de jugos gástricos y con la respectiva anticipación:

Una semana antes de la toma de la muestra, debe suspender:

- Medicamentos que inhiben la secreción de ácido gástrico:
 - ✓ ranitidina: (Ranitax) y famotidina.
- Inhibidores de la bomba de protones:
 - ✓ lanzoprazol: (Gastride, Langastrol, etc.)
 - ✓ omeprazol: (Losec, Lomex, Zomepral, etc)
 - ✓ esomeprazol: (Nexium)
 - ✓ pantoprazol: (Zoltum, Zurcal)
 - ✓ rabeprazol o pariprazol: (Gastrodine)

Un día antes de la toma de muestra, debe suspender:

- Medicamentos para neutralizar la secreción acida del estómago:
 - ✓ antiácidos: (Gaviscón, leche de magnesia, Antiax, Maalox, sal de fruta, Tabletas Phillips, bicarbonato, etc.)
- Agentes protectores de la mucosa (Mucipep-C)

4 Horas antes del examen debe suspender:

- Comidas, bebidas y cigarrillos

Consulte a su médico acerca de la interrupción de la medicación. En caso de que los medicamentos anteriores no se puedan interrumpir, informe detalladamente de ellos a la persona que está tomando la muestra de sangre.

- **Laboratorio Clínico Gebrax. Av. Suecia (Norte) 0119, Oficina 305 Providencia.
Estación Metro Los Leones.
Consultas y reserva de hora, Fono: 2 3223 8787**
- **Centro médico FARR. Eyzaguirre 664, San Bernardo
Consulta y reserva de hora, Fono: 2 29287200**