

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE EXAMEN GASTROPANEL™

Antes de la toma de muestra de sangre, por favor siga las siguientes instrucciones: Puede tomar medicación previamente prescrita y habitual, excepto los siguientes medicamentos que interfieren con la secreción de jugos gástricos y con la respectiva anticipación:

Una semana antes de la toma de la muestra, debe suspender:

- Medicamentos que inhiben la secreción de ácido gástrico:
 - ranitidina: (Ranitax) y famotidina.
 - Inhibidores de la bomba de protones:
 - lanzoprazol: (Gastride, Langastrol, etc.)
 - omeprazol: (Losec, Lomex, Zomepral, etc)
 - esomeprazol: (Nexium)
 - pantoprazol: (Zoltum, Zurcal)
 - rabeprazol o pariprazol: (Gastrodine)

Un día antes de la toma de muestra, debe suspender:

- Medicamentos para neutralizar la secreción acida del estómago:
 - antiácidos: (Gaviscón, leche de magnesia, Antiax, Maalox, sal de fruta, tabletas Phillips, bicarbonato, etc.)
- Agentes protectores de la mucosa (Mucipep-C)

4 Horas antes del examen debe suspender:

- Comidas, bebidas y cigarrillos

Consulte a su médico acerca de la interrupción de la medicación. En caso de que los medicamentos anteriores no se puedan interrumpir, informe detalladamente de ellos a la persona que está tomando la muestra de sangre.

Dirección: Laboratorio Clínico Gebrax. Av. Suecia (Norte) 0119, Oficina 305 Providencia. Estación Metro Los Leones.
Fono: 2 3223 8787